


# *EPULIS FISSURATUM*

*- Приказ на случаи*



**Доц. д-р Цена ДИМОВА**



# ПРЕГЛЕД ОД ЛИТЕРАТУРА



**ИЗГЛЕД** – екстерна или интерна поединечна или мултипла дипла (набор) со длабока фисура (пукнатина) меѓу нив

## ■ **ЗАСТАПЕНОСТ** според:



**ЛОКАЛИЗАЦИЈА**



**ПОЛ**



**ВОЗРАСТ**



**ИЗМИНАТО ВРЕМЕ** со протези



**ВИД** на протези

- **Rodriguez AF. Sacsquispe SJ.** Hiperplasia fibrosa inflamatoria y posibles factores asociados en adultos mayores. Rev Estomatol Herediana 2005; 15 (2): 139 - 144
- **Gavasova G. Budev I.** Epulis fissuratum – Clinical appearance and treatment. Pharmacologyonline 2008; 2: 50-55












# Epulis Fissuratum




# ЕТИОПАТОГЕНЕЗА

➡ ТРАУМА

➡ ИРИТАЦИЈА

➡ РЕДУКЦИЈА

Filipovik      Nacamoto



Степенот на редукција на алвеоларниот гребен е висок во првата година по екстракција на забот и изнесува околу **12 мм**, а потоа околу **0,2мм** во следните години.

Процесот е хроничен, прогресивен, неотповиклив и кумулативен.

■ **Редукција на *pr. alveolaris* на горна и долна вилица по екстракција**